

ARE YOU PROTECTED AGAINST MEASLES?

Measles is a very contagious disease caused by a virus. It can be dangerous, especially for babies and young children. Protect your family and your community now.



Measles spreads through the air when a sick person coughs or sneezes. The virus can stay in the air for 2 hours after a person with measles leaves the space. It is so contagious that about 9 out of 10 people who come near a person with measles and are not protected by vaccination will also become infected.

Measles symptoms appear 7 to 14 days after contact with the virus. Common measles symptoms include:



High fever
(may spike to more than 104°F)



Cough



Runny nose



Red or watery eyes



Rash
(3-5 days after symptoms begin)

Measles can cause severe health problems, including:



Pneumonia



Swelling of the brain



Possibly even death

Ask your healthcare provider about the MMR vaccine

The best way to protect against measles....

is with the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. It's never too late to get vaccinated. Vaccination helps protect you, the people around you, and your community. If you are not vaccinated, consider staying at home or away from crowded areas until measles cases in the area decrease, especially to protect people in your family that could get very sick.

Get vaccinated through your healthcare provider, pharmacy, or participating urgent care. You can also get vaccinated at the health department - call (610) 344-4414.

If you think that you or someone in your family have measles, stay away from others and call a healthcare provider, urgent care, or emergency room before seeking medical care.

For more information, visit www.chesco.org/measles



¿Está protegido contra el SARAMPIÓN?

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus. Puede ser peligroso, especialmente para los bebés y los niños pequeños. Proteja a su familia y a su comunidad.



El sarampión se propaga por el aire cuando una persona enferma tose o estornuda. El virus puede permanecer en el aire durante 2 horas después de que la persona con sarampión se vaya del lugar. Es tan contagioso que aproximadamente 9 de cada 10 personas que se acercan a una persona con sarampión y no están protegidas por la vacuna también se infectarán.

Los síntomas del sarampión aparecen entre 7 y 14 días después del contacto con el virus. Los síntomas comunes del sarampión incluyen:



Fiebre alta
(puede alcanzar
más de 40 °C)



Tos



Moqueo



Ojos rojos y/o
llorosos



Sarpullido
(aparece de 3 a 5
días después del
inicio de los
síntomas)

El sarampión puede causar problemas graves de salud, como:



Neumonía



Inflamación
del cerebro



Incluso la
muerte

Pregúntele a su proveedor de atención médica sobre la vacuna triple vírica.



La mejor manera de protegerse contra el sarampión...

es con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Nunca es demasiado tarde para vacunarse. La vacunación ayuda a protegerle a usted, a quienes le rodean y a su comunidad. Si no está vacunado, considere quedarse en casa o lejos de lugares donde este mucha gente, hasta que disminuyan los casos de sarampión en el área, especialmente para proteger a los miembros de su familia que podrían enfermar gravemente.

Vacúnese a través de su proveedor de atención médica, en una farmacia o en un centro de atención de urgencia participante. También puede vacunarse en el departamento de salud; llame al (610) 344-4414.

Si cree que usted o algún familiar tiene sarampión, manténgase alejado de otras personas y llame a un profesional de la salud, a un centro de atención de urgencias o a una sala de emergencias.

más información visita: www.chesco.org/measles



Chester County
Health Department
Protecting you and your environment